



وزارة الصحة

Ministry of Health


الادارة العامة للرعاية الصيدلية

دواوئك في

جدا

تنفيذ: علي الأحمر

AliHuaidi



أدوية الغدد
في رمضان




يفضل في رمضان تناول أدوية الغدة بأحد الطريقيتين التاليتين



بعد تناول تمرة وكوب ماء
تناول دواء الغدة ثم انتظر
لمدة ٣ - ٦ دقيقة
ومن ثم تناول طعام الإفطار

بعد تناول الإفطار توقف عن تناول
أي وجبة أخرى لمدة ٤ ساعات
ومن ثم تناول دواء الغدة
والانتظار لمدة ٦ دقيقة
قبل تناول أي طعام


أو



**تجنب تناول المكمّلات الغذائيّة
التي تحتوي على الكالسيوم
والحديد في نفس موعد تناول
دواء الغدة على الأقل بـ 4 ساعات**



امتصاص دواء هرمون الغدة الدرقية
يتأثر بالأكل
لذا يجب تناوله على
معدة فارغة



أدوية الريو في رمضان



استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان
لا يفسد الصوم
لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة
وليس بطعم



- ينزع الغطاء الخارجي للبخاخ ، ومن ثم يوضع بالشكل المقلوب حتى تصبح الفوهة في الجهة السفلية.
- ترج العبوة جيداً لكي يمتنزج الفاز الحامل للدواء مع الدواء.
- يتنفس المريض برفق قبل أخذ الجرعة.
- توضع فوهة البخاخ بداخل الفم مع إحكام إغلاق الفم.
- يضغط على البخاخ ويؤخذ نفس طويل.
- يحبس النفس لعشر ثوان بداخل الرئة قبل إخراجه.

عدد الجرعات يحدده الطبيب المعالج



- يتم تحrir جرعة الدواء عن طريق وضع الإبهام على أداة التحكم بالجهاز.
- توضع فتحة الفم باتجاه المريض.
- تدفع الجرعة حتى سماع صوت (كليك) من الجهاز.
- يتم وضع الجهاز بين الشفتيين مع إغلاقه بإحكام.
- يت נשق المريض الجرعة بالسرعة القصوى ويجب حبس النفس لعشر ثوان.



- ينزع غطاء العبوة ومن ثم تمسك بشكل عمودي حتى يصبح القرص الدوار في الجهة السفلية.
- تحضر الجرعة المناسبة من خلال لف القرص حتى نهاية الشوط
- ثم يعاد لفه بالشكل المعاكس حتى ظهور (كليك).
- يزفر المريض الهواء بعيداً عن الجهاز ، ثم توضع فوهة الجهاز
- داخل فم المريض مع الإطباق المحكم عليها.
- يشطف المريض الدواء مع الهواء للرئتين ، ويجب كتم النفس لحوالي عشر ثوانٍ قبل أن يتم إخراج الهواء بعيداً عن الجهاز.

تكرر الجرعة حسب إرشادات الطبيب



أدوية السكري في رمضان




وزارة الصحة

Ministry of Health

الادارة العامة للرعاية الصيدلية



- استشر طبيبك المختص قبل شهر رمضان لتأكد من أنك قادر على الصيام في رمضان.
- التحليل في نهار رمضان لا يفطر حسب الفتوى الشرعية.
- قد يحتاج الأمر في بداية شهر رمضان لعمل تحليل سكر بشكل منتظم من أجل تعديل الجرعة حسب ما يراه الطبيب.



**جرعة الإفطار كما هي
ولأنها تسبب انخفاضاً في السكر
فيفضل تقليل جرعة السحور إلى
النصف، وإذا استمر انخفاض سكر
الدم؛ فيفضل إلغاء جرعة السحور
مع مراجعة طبيبك المختص.**



- **إذا كان المريض يستخدم الدواء 500 ملغم مرة واحدة فيأخذ الحبة عند الإفطار.**
- **إذا كان يأخذ حبتين في اليوم 500 ملغم أو 1000 ملغم فيأخذ حبة واحدة عند الإفطار وأخرى مع السحور.**
- **إذا كان يستخدم المريض ثلاث حبات يومياً فيفضل أخذ حبتان بعد الإفطار وحبة وقت السحور.**
- **إذا كان يأخذ أربع حبات فحبتان مع الإفطار وحبتان مع السحور.**
- **أما المنظم 750 XR فيفضل أخذ جرعة واحدة بعد الإفطار سواء كانت حبة أو حبتين أو ثلاث.**



- **إذا كانت تؤخذ مرة واحدة فتؤخذ عند الإفطار، وإذا كان السكر متحكماً فيه فمن الممكن تقليل الجرعة.**
- **إذا كانت تؤخذ مرتين ، فتؤخذ عند الإفطار وقبل السحور، وإذا كان السكر متحكماً فيه أكثر فيفضل تقليل جرعة السحور.**



تؤخذ نفس الجرعة
كما كان قبل رمضان



تؤخذ نفس الجرعة
كما كان قبل رمضان



تؤخذ نفس الجرعة
كما كان قبل رمضان



وزارة الصحة
Ministry of Health
الادارة العامة للرعاية الصيدلية



تؤخذ نفس الجرعة
كما كان قبل رمضان



- **إذا كان يستخدم جرعة واحدة فتوخذ مع الإفطار مع تقليل الجرعة ٣٠ - ١٥ %**
- **إذا كانت توخذ مرتين فجرعة الإفطار كما هي ويتم تقليل جرعة السحور للنصف**



- تؤخذ الجرعة الأولى كاملاً مع الإفطار
(نفس جرعة الفطور قبل رمضان).
■ جرعة السحور (جرعة العشاء قبل رمضان)
يفضل تقليلها 20 - 30 %.
■ الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان)
يتم إلغاؤها.



- **إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة ، فتؤخذ عند الإفطار كاملة.**
- **إذا كان يأخذ جرعتين ، فيأخذ نفس الجرعة عند الإفطار مع تخفيف جرعة السحور 50 %.**
- **إذا كان يأخذ ثلاث جرعات ، فيكتفي بجرعتين كما هو موضح أعلاه وتحذف الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان).**



▪ تؤخذ جرعة الصباح كما هي
مع الإفطار في رمضان.
▪ الجرعة الثانية تؤخذ عند السحور
مع مراعاة تخفيضها ٥٠٪



Lantus® SoloStar®
100 Units/ml
(Insulin glargine)

Solution for subcutaneous use

Solution for injection in 5 pre-filled pens of 3 ml

**إذا كان يستخدم جرعة واحدة فتؤخذ
مع الإفطار مع تقليل الجرعة بـ 30 - 50%**



- **تؤخذ الجرعة الأولى كاملة مع الإفطار (نفس جرعة الفطور قبل رمضان). ويمكن تعديلوها بناء على قراءة قياس السكر بعد الإفطار.**
- **جرعة السحور (جرعة العشاء قبل رمضان) يفضل تقليلها إلى النصف.**
- **الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان) يتم إلغاؤها.**



- إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة ، فتؤخذ عند الإفطار كاملة.
- إذا كان يأخذ جرعتين ، فيأخذ نفس الجرعة عند الإفطار مع تخفيف جرعة السحور 50 %




- تؤخذ جرعة الصباح كما هي مع الإفطار في رمضان.
- الجرعة الثانية تؤخذ عند السحور مع مراعاة تخفيضها ٥٠٪.
- الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان) يتم إلغاؤها.



- **تؤخذ الجرعة الأولى كاملاً مع الإفطار (نفس جرعة الفطور قبل رمضان). ويمكن تعديلوها بناء على قراءة قياس السكر بعد الإفطار.**
- **جرعة السحور (جرعة العشاء قبل رمضان) يفضل تقليلها إلى النصف.**
- **الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان) يتم إلغاؤها.**



- إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة ، فتؤخذ عند الإفطار كاملة.
- إذا كان يأخذ جرعتين ، فيأخذ نفس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور 50 %



- إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة ، فتؤخذ عند الإفطار كاملة.
- إذا كان يأخذ جرعتين ، فيأخذ نفس الجرعة عند الإفطار مع تخفيف جرعة السحور 50 %



أدوية الضغط في رمضان



يفضل أخذ أدوية الضغط بعد التراويخ
وذلك لتجنب الإحساس بالدوار



**يفضل أخذ مدرات البول بعد التراويخ
وذلك لتجنب الإحساس بالدوار
كما لا يفضل تناول مدرات البول
قبل النوم
لأنها بطبيعتها لتنبع
المريض ينفعه بنوم هادئ**



المضادات الحيوية في رمضان



وزارة الصحة
Ministry of Health
الادارة العامة للرعاية الصيدلية



يفضل تناوله عند الإفطار
جرعة واحدة



**يفضل تناوله على فترتين
عند الإفطار وعند السحور
(يجب استشارة الطبيب)**



وزارة الصحة

Ministry of Health

الادارة العامة للرعاية الصيدلية



**إذا كان يستخدم على ٣ جرعات
أو أكثر قبل رمضان
يجب استشارة الطبيب عن إمكانية
تعديل أو تغيير المضاد الحيوي
إلى آخر يؤخذ مرتين**

